

କୃଷି ସୂଚନା ସେବା (ଧାନ)

ଭା.କୃ.ଅନୁ.ପ.-ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଟକ-୭୫୩୦୦୭

୨୦୧୭ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି :

ବୁଣାଧାନ:

- ❖ ବର୍ଷାଶ୍ରୀତ ସଙ୍କ୍ଷାଳୁଆ ସିଧା ଛଟାବୁଣା ଯାଇଥିବା ଜମିରେ ଯଦି କୌଣସି ଘାସମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇନାହିଁ ତେବେ ବୁଣା ଧାନରେ ବେଉଷଣ କରନ୍ତୁ । ଯଦକ୍ଷରଜାନ ସାରର ଏକ ଡି.ଟି.ଏମ୍.ଏ.ଏ. (୧୪ କି.ଗ୍ରା. ସ୍ଫୁରିଆ/ଏକର) ପିଲସାର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଯେଉଁ ଜମିରେ ଫସଫରସ କିମ୍ବା ପଟାସ୍ ସାର ପଡିନାହିଁ ସେଥିରେ ଏକର ପ୍ରତି ୮ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ଫସଫରସ୍ ଏବଂ ୮ କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ୍ ମୂଳସାର ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ବର୍ଷାଶ୍ରୀତ ଉଚ୍ଚାଜମିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷଥର ଘାସ ବାଛିବା ପରେ ଏକ ଡି.ଟି.ଏମ୍.ଏ.ଏ. ଯଦକ୍ଷରଜାନ (୧୨ କି.ଗ୍ରା. ସ୍ଫୁରିଆ/ଏକର) ଥୋଡସାର ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ରୁଆ ଧାନ:

- ❖ ଜମି ଓଦାଳିଆ ଥିଲେ କିମ୍ବା ୨-୩ ସେ.ମି. ଠିଆ ପାଣିଥିବା ବର୍ଷାଶ୍ରୀତ ରୁଆଧାନରେ ଧାନ ରୋଇବାର ୮ ରୁ ୧୦ ଦିନ ପରେ ବାଲୁଙ୍ଗା (୨ ରୁ ୩ ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲୁଙ୍ଗା ଗଛ) ଦମନ ପାଇଁ ବେନସଲଫ୍ୟୁରାନ୍ ମିଆଇଲ୍ + ପ୍ରେଟିଲାଇକ୍ଲୋର(Ready-mix) ଦାନାଦାର (ଲୋଣ୍ଡାକୁ ପାଓ୍ଵାର/Eraser Strong @ ୪ କି.ଗ୍ରା./ଏକର) ୧୨ କି.ଗ୍ରା. ବାଲି ସହିତ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ଧାନ ରୁଆ ୧୫ ଦିନ ପରେ ୩-୪ ପତ୍ରବିଶିଷ୍ଟ ଘାସ ଦମନ ପାଇଁ ଆଜିମ୍ ସଲଫ୍ୟୁରାନ୍, ୫୦ DF @ ୨୮ ଗ୍ରାମ/ଏକର ୧୪୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଘାସମରା ଔଷଧ ଭଲଭାବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ସାବୁନ ପାଣି(surfactant) ୨୫୦ ମି.ଲି/ଏକର ହିସାବରେ ମିଶାଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ଧାନରୁଆର ୨୦-୨୫ ଦିନ ପରେ ପିଲସାର ଭାବେ ଏକ ଡି.ଟି.ଏମ୍.ଏ.ଏ. ଯଦକ୍ଷରଜାନ ସାର(ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ କିସମ ପାଇଁ ୨୪ କି.ଗ୍ରା. ସ୍ଫୁରିଆ ଏବଂ ଶଙ୍କର ଧାନ ପାଇଁ ୨୮ କି.ଗ୍ରା. ସ୍ଫୁରିଆ) ପ୍ରତି ଏକର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

- ❖ କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ପୋକର ନିରାକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରୁଆଧାନରେ ଏକର ପିଛା ୩ଟି ହିସାବରେ ଯୌନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଯନ୍ତ୍ର ରଖନ୍ତୁ । ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାପତିର ସଂଖ୍ୟା ଯନ୍ତ୍ରପ୍ରତି ୪ ରୁ ୫ ଟି ହୋଇଯିବ, ରାଇନାକ୍ଟିପାର ୦.୪ ଜି ଏକର ପିଛା ୪ କି.ଗ୍ରା ହିସାବରେ ୧:୧ ଅନୁପାତରେ ବାଲି ସହିତ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ବହୁତ ଖରା ପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ଲେଡା ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଯାଏ । ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୨୦EC ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଗ୍ରାଇଯୋଫସ୍ ୪୦ EC ୨.୫ମି.ଲି./ଲିଟର ପାଣିରେ ଗଛର ପତ୍ର ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନରେ ବିରହା ପୋକ ଏବଂ ନଳାପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ସହିତ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ❖ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜନିତ ପତ୍ରପୋଡା ରୋଗର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ପ୍ଲୁଷୋମାଇସିନ୍ ୧ ଗ୍ରାମ ସହିତ ୧ ଗ୍ରାମ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦରକାର, ଏକ ଏକର ଜମି ପାଇଁ ୨୦୦ ଲିଟର ହିସାବରେ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ପଗାସ୍ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ନ ହୋଇଥିବ ତେବେ ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ୮ ରୁ ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
