

କୃଷି ସୂଚନା ସେବା (ଧାନ)

ଭା.କୃ.ଅନୁ.ପ.-ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଟକ-୭୫୩୦୦୭

୨୦୧୭ ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି :

ସିଧା ବୁଣାଧାନ:

- ❖ ବର୍ଷାଶ୍ରୀତ ସନ୍ଧ୍ୟାଲୁଆ ସିଧା ଛଟାବୁଣା ଯାଇଥିବା ଜମିରେ ଯଦି କୌଣସି ଘାସଥିବା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇନାହିଁ ତେବେ ଧାନ ବୁଣାର ୨ ସପ୍ତାହ ପରେ କିମ୍ବା ୨-୩ ପତ୍ରଘାସ ଗଛରେ ଘାସମରା ଔଷଧ ଯଥା ଆଜିମସଲଫ୍ୟୁରାନ୍ ୫୦% DF @ ୨୦ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ବିସିପିରିବାକ୍ ସୋଡିୟମ୍ ୧୦% SC @ ୧୨୦ ମି.ଲି. ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
କିମ୍ବା ଫେନୋକ୍ସାପ୍ରୋପିଲ୍ - ପି-ଇଥାଇଲ୍ ୨ ଇ.ସି. @ ୨୨୦ ମି.ଲି. ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ଧାନ ବୁଣାର ୨୦ ଦିନ ପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
- ❖ ବର୍ଷାଶ୍ରୀତ ଉଚ୍ଚାଜମି ଯେଉଁଠି ଘାସ ମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇନାହିଁ ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ହାତରେ କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗୁଳି ଘାସବନ୍ଧା ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଘାସ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ।

ରୁଆ ଧାନ:

- ❖ ଜଳସେଚିତ ମଝିଆଳି ଜମିରେ ନବୀନ, ଲଲାଟ, ସି.ଆର.ଧାନ ୩୦୫, ସି.ଆର.ଧାନ ୩୦୪, ସି.ଆର.ଧାନ ୩୧୦ ଏବଂ ଅଜୟ (ସଙ୍କର),ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ (ସଙ୍କର) ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଜଳସେଚିତ କିମ୍ବା ବର୍ଷାଶ୍ରୀତ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ଧାନ କିସମ ତଥା ପୂଜା, ସି.ଆର.ଧାନ ୩୦୦, ସି.ଆର.ଧାନ-୭୦୧(ସଙ୍କର)ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- ❖ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବର୍ଷାହେଉଥିବା, ଜଳସେଚିତ ଏବଂ ବର୍ଷାଶ୍ରୀତ ଜମିରେ ଆର୍ଦ୍ରତଳିଘରାରେ ଗଜାଧାନ ବୁଣନ୍ତୁ।
- ❖ ୩୨୦ ବର୍ଗମିଟର ତଳିଘରାକୁ ଭଲଭାବେ କାଦୁଅ କରି ସମତୁଲ କରି ୧୮-୨୦ କି.ଗ୍ରା. ଧାନ ବିହନ ବୁଣନ୍ତୁ। ଧାନ ବୁଣିବା ସମୟରେ ୪ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୪ କି.ଗ୍ରା. ଫସ୍ ଫରସ୍, ୪ କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ୍ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
- ❖ ଧାନ ରୁଆ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନ ରୋଇବା ପାଇଁ ମଶିଣା ତଳିଘରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ପଲିଥିନ୍ କୁ ସମାନ ଭାବେ ବିସ୍ତୃତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପରେ ୨୪ X ୪୦ ସେ.ମି.ର ଏକ କାଠ ଛାଞ୍ଚ ରଖନ୍ତୁ। ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ଛାଞ୍ଚରେ ଗୁଣ୍ଡ ମାଟି ଭରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଛାଞ୍ଚ ଘରାରେ ୧୨୫ ଗ୍ରାମ୍ ଧାନ ବିହନକୁ ରୁଟେକ୍ସ @ ୩ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରତି କି.ଗ୍ରା. ବିହନ ହିସାବରେ ମିଶାଇ ବୁଣନ୍ତୁ। ବୁଣିସାରିବା ପରେ ମଞ୍ଜିକୁ ଗୁଣ୍ଡମାଟିର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଦ୍ଵାରା ଘୋଡାଲ ଦିନେ ଛାଡି ଦିନେ ହିସାବରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଫଳରେ ୧୫-୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏକ ଏକର ଜମି ପାଇଁ ୩୨ ଟି ଏହିପରି ତଳି ମଶିଣା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ।
- ❖ ବାଲୁଙ୍ଗା ଦମନ ପାଇଁ ୩୨୦ ବର୍ଗମିଟର ତଳିଘରାରେ ୫୨ ମି.ଲି. ପ୍ରେଟିଲିକୋର ୫୦ ଇ.ସି. କିମ୍ବା ପାଇରାଜୋନ୍ ସଲଫ୍ୟୁରାନ୍ ଇଥାଇଲ ୧୦% DF ୨.୪ ଗ୍ରାମ୍ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।

- ❖ ମୂଳ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ୭-୧୦ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୁଇଥର କାନ୍ଥୁଅ କରି ଜମିକୁ ସମତୁଲ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଫଳରେ ସମାନ ଭାବରେ ଗଛ ରହିଥାଏ । ପ୍ରଥମ ଥର କାନ୍ଥୁଅ ସମୟରେ ଏକର ପିଛା ୨ ଟନ୍ ହିସାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାରର ଏକ ଚୂଡ଼ାଘାଂଶ(୧୪ କି.ଗ୍ରା ଯୁରିଆ/ଏକର) ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଫସ୍ ଫରସ୍ ଏବଂ ପଟାସସାର(୪୪ କି.ଗ୍ରା DAP) ଏବଂ ୩୪ କି.ଗ୍ରା. ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ ପଟାସ୍) ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ରୋଇବାର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଛକୁ ଯୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ୨୫-୩୦ ଦିନରେ ତଳିକୁ ଉପାଡ଼ି ସାରିବା ପରେ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫଓସ୍ ଦ୍ରବଣରେ (୧ ମି.ଲି./ଲିଟର) ପାଣି ବୁଡ଼ାଇ ରୁଅନ୍ତୁ ।
- ❖ ପ୍ରତି ବୁଦାରେ ୨-୩ ଟି ହିସାବରେ ତଳି ୨୦X୧୫ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ ରୋଇଦିଅନ୍ତୁ । ରୋଇବାର ୧୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧-୨ ସେ.ମି. ଠିଆ ପାଣି ବିଲରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- ❖ ରୁଆଧାନରେ ବାଲୁଙ୍ଗା ଦମନ ପାଇଁ ବେନସଲଫୁରନ୍ ମିଥାଇଲ ୦.୨% + ପ୍ରିଟିଲାକ୍ଲୋର ୨% GR (ଲୋଣ୍ଡେକ୍ସ ପାଉଡର କିମ୍ବା /Erase strong) ୪ କି.ଗ୍ରା./ଏକରକୁ ସମାନ ପରିମାଣର ବାଲି ସହିତ ମିଶାଇ ରୋଇବାର ୩ରୁ ୬ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
