

## କୃଷି ସୂଚନା ସେବା (ଧାନ)

ଭା.କୃ.ଅନୁ.ପ-ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଟକ-୭୫୩୦୦୭

### ୨୦୧୭ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ :

- ❖ ବର୍ଷାଶ୍ରୀତ ସଙ୍କଳାଳୁଆ ସିଧା ଛଟାବୁଣା ଯାଇଥିବା ଜମିରେ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଯବସାରଜାନ ସାର (୧୪ କି.ଗ୍ରା. ସ୍ଫୁରିଆ/ଏକର) ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିସାର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଯବସାରଜାନ ସାର(ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ କିସମ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୪ କି.ଗ୍ରା ସ୍ଫୁରିଆ ଏବଂ ଶଙ୍କର ଧାନ ପାଇଁ ୨୮ କି.ଗ୍ରା. ସ୍ଫୁରିଆ ସାର) ଧାନରୁଆର ୨୦-୨୫ ଦିନ ପରେ (ଘାସ ବାଛିସାରିବା ପରେ) ପିଲସାର ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତେରିରେ ରୁଆଯାଇଥିବା ଧାନରେ ଶତକଡ଼ା ୨୦ ଭାଗ ଅଧିକ ଯବସାରଜାନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ସଅଳ/ଠିକ୍ ସମୟରେ ରୁଆଯାଇଥିବା ଧାନରେ ୪୦-୪୫ ଦିନ ପରେ (ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ କିସମପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୪ କି.ଗ୍ରା. ସ୍ଫୁରିଆ ଏବଂ ଶଙ୍କର ଧାନ ପାଇଁ ୨୮ କି.ଗ୍ରା. ସ୍ଫୁରିଆ ସାର) ଥୋଡ଼ ସାର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ନିରାକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରୁଆଧାନରେ ଏକର ପିଛା ୩ଟି ହିସାବରେ ଯୌନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଯନ୍ତ୍ରା ରଖନ୍ତୁ । ଯଦି ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାପତିର ସଂଖ୍ୟା ଯନ୍ତ୍ରାପ୍ରତି ୪ ରୁ ୫ ଟି ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଏକର ପିଛା ଅଥାମେଥୋକ୍ସାମ୍ ୨୫ WG @ ୪୦ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୨୦EC @ ୨୦୦ ମି.ଲି. ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୋକ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ ତେବେ ଏକର ପିଛା ରାଇନାକ୍ସିପାର ୦.୪G ୪ କି.ଗ୍ରା କିମ୍ବା କାର୍ବୋଫୁରାନ୍ ୩G ୧୩ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ଏହି ସମୟରେ ଲେଡାପୋକ, ବିରହା ପୋକ, ନଳାପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ତେବେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୨୦EC ୩ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଗ୍ରାଇଜୋଫସ୍ ୪୦ EC ୨.୫ ମି.ଲି. ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଏକର ପିଛା ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ବଙ୍ଗାପୋକକୁ ଦମନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକର ପ୍ରତି କାର୍ବୋସଲଫାନ୍ ୨୫% EC ୪୦୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା କାରଟାପ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୪ G ୧୦ କି.ଗ୍ରା. କିମ୍ବା କାର୍ବୋଫୁରାନ୍ ୩ G ୧୩ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ପତ୍ରପୋଡା, ପତ୍ରପୋଡା ଗାର (Leaf streak) ରୋଗ ଧାନରେ ଦେଖାଦେଲେ ପ୍ଲୁଷୋମାଇସିନ୍ ୧ ଗ୍ରା./ଲିଟର କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ୍ ୧୫୦ ମି.ଗ୍ରା. ସହିତ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୧ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୮ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଦୁଇଥର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଏକର ପିଛା ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ମହିଷା ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ କାର୍ବେନ୍ଡାଜିମ୍ ୫୦WP @ ୨ ଗ୍ରାମ୍/ଲିଟର କିମ୍ବା ଗ୍ରାଇସାଇକ୍ଲୋଜୋଲ ୨୫ WP @ ୦.୨ ଗ୍ରାମ୍/ଲିଟର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବେଲ ପତ୍ରରସ (୨୫ ଗ୍ରାମ୍ ପତ୍ର) କିମ୍ବା ତୁଳସୀ (୨୫ ଗ୍ରାମ୍ ପତ୍ର) କିମ୍ବା ନିମ୍ବ (୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ପତ୍ର) ରସ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ଉଚ୍ଚ ଜମିରେ ପ୍ରତି ବର୍ଗମିଟର ପିଛା ୨-୩ଟି ଗନ୍ଧିପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିଥାଇଲ୍ ପାରାଥାଥନ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କଲାବେଳେ ପାଗ ପରିଷ୍କାର ଥିବା ଦରକାର । ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

\*\*\*\*\*