

## କୃଷି ସୂଚନା ସେବା (ଧାନ)

ଭା.କୃ.ଅନୁ.ପ-ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଟକ-୭୫୩୦୦୭

୨୦୧୭ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର :

- ❖ ବର୍ଷାଶ୍ରୀତ ସଙ୍କଳ୍ପାଳୁଆ ସିଧା ଛଟାବୁଣା ଯାଇଥିବା ଜମିରେ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର (୧୪ କି.ଗ୍ରା. ସ୍ଫୁରିଆ/ଏକର) ଦ୍ଵିତୀୟ କିଷ୍ତିସାର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
- ❖ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର(ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ କିସମ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୪ କି.ଗ୍ରା ସ୍ଫୁରିଆ ଏବଂ ଶଙ୍କର ଧାନ ପାଇଁ ୨୮ କି.ଗ୍ରା. ସ୍ଫୁରିଆ) ଧାନରୁଆର ୨୦-୨୫ ଦିନ ପରେ ଘାସ ବାଛିସାରି ଦ୍ଵିତୀୟ କିଷ୍ତିସାର ଭାବେ ଡେରିରେ ରୁଆଯାଇଥିବା ଧାନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ସଅଳ ରୁଆଯାଇଥିବା ଧାନରେ ୪୦-୪୫ ଦିନ ପରେ ସମାନ ପରିମାଣର ସାର ଦ୍ଵିତୀୟ କିଷ୍ତି ସାର ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
- ❖ ଡେରିରେ ରୁଆ ଯାଇଥିବା ଧାନରେ ଶକ୍ତିଗୁଣିତ ଘାସମରା ଯକ୍ଷ ବା କୋନୋଉଇଡର ବ୍ୟବହାର କରି ରୁଆର ୨୦ ଦିନପରେ ଘାସ ବଛା ବଛି କରିଦିଅନ୍ତୁ।
- ❖ ବର୍ଷାଶ୍ରୀତ ରୁଆଧାନରେ ଶିଘ୍ର ବାହାରୁଥିବା ଅନାବନା ଘାସ ଦମନ ପାଇଁ ବେନ୍ସଲପ୍ୟୁରାନ୍ ମିଆଇଲ ସହିତ ପ୍ରେଟିଲକ୍ଲୋର(ରେଡିମିକ୍ସ) ଦାନାଦାର ଲୋଣ୍ଡାକୁ ପାଞ୍ଚା/ଇରୋଜ୍ ସ୍ଫୁଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ୪ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ରୋଇବାର ୮ ରୁ ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବାଲି ସହିତ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ୧୨ କି.ଗ୍ରା. ବାଲି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ ମାଟିରେ ବତର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
- ❖ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ନିରାକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରୁଆଧାନରେ ଏକର ପିଛା ୩ଟି ହିସାବରେ ଯୌନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଯନ୍ତ୍ରା ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାପତିର ସଂଖ୍ୟା ଯନ୍ତ୍ରାପ୍ରତି ୪ ରୁ ୫ ଟି ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଏକର ପିଛା ଅଥାମେଥୋକ୍ସାମ୍ ୨୫ WG @ ୪୦ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୨୦ EC @ ୬୦୦ ମି.ଲି. ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୋକ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ରାଇନାକ୍ସିପାର ୦.୪ G ୪ କି.ଗ୍ରା କିମ୍ବା କାର୍ବୋଫୁରାନ୍ ୩ G @ ୧୩.୨ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
- ❖ ଏହି ସମୟରେ ଲେଡାପୋକ, ବିରହା ପୋକ, ନଳୀପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ତେବେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୨୦ EC @ ୩ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଟ୍ରାଇଜୋଫସ୍ ୪୦ EC @ ୨.୫ମି.ଲି. ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଏକ ଏକର ନିମନ୍ତେ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- ❖ ବଙ୍ଗାପୋକକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଏକର ପିଛା କାର୍ବୋସଲଫାନ୍ ୨୫% EC @ ୪୦୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା କାରଗାପ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୪ G @ ୧୦ କି.ଗ୍ରା. କିମ୍ବା କାର୍ବୋଫୁରାନ୍ ୩ G ୧୩.୨ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
- ❖ ଯଦି ପତ୍ରପୋଡା, ପତ୍ରପୋଡା ଗାର (ଖରବଲ ସ୍ଫୁଷ୍ଟରବଲ) ରୋଗ ଧାନରେ ଦେଖାଦିଏ ତେବେ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟୋମାଇସିନ୍ ୧ ଗ୍ରା. କିମ୍ବା ସ୍ଫେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ୍ ୧୫୦ ମି.ଗ୍ରା. ସହିତ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୧ ଗ୍ରାମ୍ ମିଶାଇ ୮ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଦୁଇଥର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
- ❖ ମହିଷା ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ କାର୍ବେନ୍ଡାଜିମ୍ ୫୦ WP @ ୨ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଇସାଇକ୍ଲୋଜେଲ ୭୫ WP @ ୦.୬ ଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ବେଲ ପତ୍ରରସ(୨୫ ଗ୍ରାମ୍ ପତ୍ର) କିମ୍ବା ଭୂଜସା ପତ୍ର ରସ(୨୫ ଗ୍ରାମ୍ ପତ୍ର) କିମ୍ବା ନିମ(୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ପତ୍ର) ପତ୍ର ରସ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରି ଏହି ରୋଗ ଦମନ କରନ୍ତୁ।

\*\*\*\*\*