

ରୋଗ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ:

- > ୧ ମି.ଲି. ଲ୍ଫୋରୋପାଲରିଫସ୍ (20 EC) କୁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଦ୍ରବଣ କରିବେ ଏବଂ ଧାନ ଚୋପଣ ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ରବଣରେ ଚଳିକୁ ବୁଡାଇ ସାରା ରାତି ରଖିବା ଉଚିତ୍ ।
- > କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ଏବଂ ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା କାର୍ବୋଥ୍ଫ୍ୟୁରାନ ୩୦ କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ।
- > ପତ୍ରଛଦା ପୋଡ଼ା ରୋଗ ଦେଖାଗଲେ, ଥୋଡ଼ ଆସିବା ସମୟରେ ଯବକ୍ଷାରଜୀନ ବ୍ୟବହାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ୍ । ରୋଗ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ଭଲିଡ଼ାମାଲସିନ୍ ୩.୦ ମି.ଲି. ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ କିମ୍ବା ପ୍ରୋପିକୋନାଲୋଲ୍ (୨୫ ପ୍ରତିଶତ) ୧ ମି.ଲି. ପ୍ରତିଲିଟର ପାଣିରେ ୫୦୦ ଲିଟର ଦ୍ରବଣ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଶୀର୍ଷ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ପରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
- > ରୋଗ ପୋକ ଅକ୍ରମଣରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହୁଡ଼ାଗନ୍ଧ ଭଲଭାବେ ସଫା କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ଅମଳ କରିବା, ଶୁଖେଇବା ଏବଂ ସାଇତିରଖିବା

- > ଫୁଲ ଆସିବାର ୩୦-୩୫ ଦିନପରେ ଫସଲ କାଟିବା ଉଚିତ୍ । ଗଛ ସବୁକୁ ଚଂଗ ଥାଇ କାଟିଲେ, କେଣ୍ଟାର ମଞ୍ଜି ଝଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ । ଅମଳ ସମୟରେ ଧାନର ଆର୍ଦ୍ରତା ୨୦-୨୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବା ଉଚିତ୍ ।
- > ଫସଲ କାଟିବାର ପରେ ପରେ ଅମଳ କରିବା ଉଚିତ୍ । ବିହନ ପାଇଁ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଚାଉଳ ପାଇଁ ୧୪ ପ୍ରତିଶତ ଆର୍ଦ୍ରତା ରଖିବା ଉଚିତ୍ ।
- > ଚାଉଳ କରିବା ପାଇଁ ଧାନକୁ ହଲର ମେସିନ୍ ସହାୟତାରେ କରାଯାଇପାରିବ । କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଁ ସେଲରେ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ:

ତିନେସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଧାନଫସଲ ଅମଳ ପରେ ଜମିରେ ଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ଉପଯୋଗ କରି ମୁଗ ଫସଲ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ଢ଼େଣା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷାଜଳ ପ୍ଲୁବିତ ଖାଲୁଆ ଜମି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ସର୍ଷ୍ଟ ସବ-୧

ସି.ଆର୍.ଆର୍.ଆଇ ବୈଷୟିକ ଇଷ୍ଟାହାର - ୭୪
 ଉତ୍ପାଦ ସମ୍ପର୍କିତ - କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଭୁବନେଶ୍ଵର, ୨୦୧୧
 ସମ୍ପାଦନା ଏବଂ ପୃଷ୍ଠା ବିନ୍ୟାସ : ବି.ଏନ.ସତ୍ଵଜି, ଜି.ଏ.କେ.କ୍ଳୁମାର ଏବଂ ସଂସ୍ଥା ରାଣୀ ଦଲାଇ
 ଫଟୋ: ପ୍ରକାଶ କର, ଭରବାନ ବେହେରା ଏବଂ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ
 ମୁଦ୍ରଣ - ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଟକ,
 ଢ଼େଣା - ୭୫୩ ୦୦୭ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ

ଢ଼େଣା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷାଜଳ ପ୍ଲୁବିତ ଖାଲୁଆ ଜମି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ କିଷମ: ସର୍ଷ୍ଟ ସବ-୧

ଡ଼େ.ଏନ୍.ରେଡ୍ଡି, ଏସ୍.ଏସ୍.ସି.ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆର୍.କେ.ସରକାର ଏବଂ କେ.ଏ.ରାଓ



ସର୍ଷ୍ଟ-ସବ-୧ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରିଷଦ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରଜିତାୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆବିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଛି । ତିନି ବର୍ଷର ଫଳାଫଳକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଲା ପରେ ଢ଼େଣା ରାଜ୍ୟ ବିହନ ଉପକମ୍ପିତି ସର୍ଷ୍ଟ ସବ୍ -୧ କିଷମକୁ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ଏହା ଏକ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ (୧୦୫ ରୁ ୧୧୦ ସେ.ମି.) କିଷମ ଅଟେ । ବୁଣା ଧାନ ଫସଲ ୧୪୦ ଦିନରେ ଏବଂ ଚଳିତୁଆ ଫସଲ ୧୪୫ ଦିନରେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଥାଏ ।

ସର୍ଷ୍ଟ ସବ-୧ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା ୪.୫-୫.୫ ଟନ୍ ଅମଳ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଅଭାବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ୩.୦ ରୁ ୪.୦ ଟନ୍ ଅମଳ ଦେଇଥାଏ । କୃଷକ ଯେଉଁ ଜମିରେ ସର୍ଷ୍ଟ କିଷମ ଧାନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଜମିରେ ସର୍ଷ୍ଟ-ସବ-୧ କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିପାରିବେ । ଏହି କିଷମ ଖାଲୁଆ ଓ ମଧ୍ୟମ ଜମି ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ । ଶାରଦରତ୍ନରେ ଆକର୍ଷକ ବନ୍ୟାରେ ୧୨-୧୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରି ସହଣୀ ଶକ୍ତି ଏହି କିଷମର ଅଛି । ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାଜଳ ୧୫-୨୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏହି କିଷମ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ।

ବାସ ପରୀକ୍ଷା:

ଶୁଷ୍କ ଚଳିତେରା ପଦ୍ଧତି:

- > ଚଳି ଯେବା କମ୍ପିକୁ ଭଲଭାବେ ଚାଷ କରି ସମତୁଳି କରାଯାଏ । ଚଳିତେରା କମ୍ପିକୁ ଖଳି କରାଯାଇଯାଇଥାଏ । ୧.୦ ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ଦରକାର ମୁତାବକ ଲମ୍ବା ରଖାଯାଏ । ଏକ ବେତରୁ ଅନ୍ୟ ବେତରୁ ୪୦ ସେ.ମି. ଦୂର ରଖାଯାଇଥାଏ । ପାଖାପାଖି ୧ ଏକର କମି ରୋଇବା ପାଇଁ ୧୦ ଡିସିମିଲି କମି ଚଳିତେରା ପାଇଁ ନିଆଯାଏ ।

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୟନ ଏବଂ ମାତ୍ରା:

- > ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଲୁହା ଦ୍ରବଣ ହୁଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୟନ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡିଥାଏ । ଉପଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୬୦ ଗ୍ରାମ ସାଧାରଣ ଲୁହାକୁ ମିଶାଇ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।
- > ଲୁହା ଦ୍ରବଣରେ ଧାନକୁ ରୁଡ଼ାଯାଏ, ଉପରେ ଭାସୁଥିବା ଅଳିଆ ଅଗାଡି ଆଡିକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଉପରେ ଭଲ ପାଣିରେ ମଞ୍ଜିକୁ ଯୋଗ ବାହାର କରାଯାଏ ।
- > ରୁଡ଼ାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପଛା ୨୫-୩୦ କି.ଗ୍ରା. ଏବଂ ଖରୁଡି ରୁଣା ଫସଲ ପାଇଁ ୬୦-୭୦ କି.ଗ୍ରା. ଧାନ ନିଆଯାଇଥାଏ ।

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିବୋଧନ:

ରକ୍ଷା ମଞ୍ଜି ରୁସୁଧରେ: ପ୍ରତି କି.ଗ୍ରା. ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଇଁ ବାଲିଷ୍ଟମ୍ ୨.୦ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଭଲଭାବରେ ରୋଜାଇ ଦିଆଯାଏ । ମଞ୍ଜି ରୋଜାଇବା ଯତ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ।

ବଚର ବୁଣା କରୁଥିଲେ: ୧.୫ ଗ୍ରାମ ହେପ୍ଟୋକ୍ଲୋରିନ୍, ଏବଂ ୨୦ ଗ୍ରାମ କ୍ୟାପ୍ଟାନ ୨୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶେଇ ତିଆରି କରିଥିବା ଦ୍ରବଣରେ ଧାନ ମଞ୍ଜିକୁ T - ୧୦ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତେଜ ରଖାଯାଏ । ଏହି ଦ୍ରବଣରେ ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ଧାନ ମଞ୍ଜି ବିବୋଧନ ହୋଇପାରିବ । ମଞ୍ଜିକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରି ମଞ୍ଜିକୁ ରୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଛାଇରେ ଶୁଖା ଯାଇଥାଏ ।

ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ସମୟ:

- > ଖରୁଡି ରୁଣା ଧାନ ପାଇଁ କୁନି ମାସର ପ୍ରଥମ ୨ ସପ୍ତାହ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ ।
- > ରୁଆ ଯାଉଥିବା ଫସଲ ପାଇଁ କୁନି ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଚଳି ପକାଇବା ଉଚିତ ।

ବହୁତ ଚଳିତେରା ପରିଚାଳନା:

- > ମଞ୍ଜିକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁରାଯାଏ, କଳକୁ ଭଲଭାବେ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପରେ ମଞ୍ଜିକୁ ରୋଜାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଘୋଡେଇ ଦିଆଯାଏ ।
- > ଗଜା ବାହାରିବା ମଞ୍ଜିକୁ ଚଳି ଯେବାରେ ରୁଣାଯାଏ ଏବଂ ଚଳି ଘେରାକୁ ୫-୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡବା ରଖାଯାଏ ।
- > ଚଳିତେରାରେ ଚଳି ୨.୫ ସେ.ମି. ହୋଇଗଲେ ପାଣିର ଏକ ପତଳା ଝର ରଖାଯାଇଥାଏ ।
- > ଦରକାର ପଡିଲେ କାର୍ବୋଫ୍ୟୁରାନ୍ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପଛା ୧ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ।
- > ଚଳିତେରାରୁ ଚଳି ଉପୁଡେଇବାରେ ୨ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟରରେ ୧୦୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରକାର ଶାର୍ଷ ସାର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ।

କମି ପଦ୍ଧତି:

- > ପ୍ରକ ମୈତ୍ରୁମା ବର୍ଷା କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଫସଲ ଅମଳ ପରେ ପରେ କମ୍ପିକୁ ଡ୍ରାୟର ବା ବଳଦେଣା ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କରିଦେବା ଉଚିତ । ଯାହା ଫଳରେ ରୋଗପୋକ ଏବଂ ଅମାବନା ଘାସର ପ୍ରାୟୁତ୍ତାବହୁ ଧାନ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ।
- > ୭-୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରେ କମ୍ପିକୁ ଚାଷକରି ୨ ଥର କାଢ଼ି କରାଯାଏ, ଫଳରେ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ଖାଦ୍ୟସାଗର ଉତ୍ପାଦନପତା ବଢ଼ିଥାଏ । ମଇ ବ୍ୟବହାର କରି କମ୍ପିକୁ ସମତୁଳି କରାଯିବ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପିରେ ପାଣିଷର ସମାନ ରହେ ।

ଚଳି ରୁଆ ଏବଂ ଲଗେଇବା ବୃତ୍ତା:

- > କୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଚଳି କରାଯାଏ । ପ୍ରତି ବୃତ୍ତାରେ ୧ ରୁ ୩ଟି ଚଳି ହିସାବରେ ୨୦ x ୧୫ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ କରାଯାଏ । ଧାଡି ରୁଆ କରୁନଥିଲେ ଏକ ବର୍ଗ ମିଟର ପଛା ୩୫-୪୦ ବୃତ୍ତା ରଖାଯାଏ ।

- > ୭ ଦିନ ପରେ ଖାଲି ପଡିଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଚଳି ଲଗେଇବା ଉଚିତ । ଦରକାର ପଡିଲେ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ପିଲରେ ଥିବା ଧାନ ଗଛ ବ୍ୟବହାର କରି ଚଳି ଦୂରାଫଳ ଲଗେଇବା ଉଚିତ ।

- > ବିକ୍ରମରେ ଚଳିତେରା କରୁଥିଲେ ଗଛକୁ ଗଛ ଦୂରତା କମ ରଖାଯାଏ (୧୫ x ୧୫ ସେ.ମି.) ଏବଂ ବୃତ୍ତା ପଛା ୫-୬ ଟି ଚଳି ଲଗାଯାଇଥାଏ । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯବକ୍ଷାରକାର ସାଉରୁ ପୁଲିଆର ରୂପେ ଅଧିକ ଦିଆଯାଏ ।

- > ଯଦି ଚଳି ଘେରାରେ କାର୍ବୋଫ୍ୟୁରାନ୍ ବିଶେଷତା ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ଚଳିକୁ ୧ମି.ଲି. କ୍ଲୋରୋପାଇରିଡ଼ିଫ (20 EC) କୁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶେଇ ତିଆରି କରିଥିବା ଦ୍ରବଣରେ ସାଗାରାଡି ରଖାଯାଏ, ଫଳରେ ଧାନଫସଲକୁ ମ୍ୟାଗଟ ଏବଂ କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ଯୋଗ ଦାଉରୁ ଗଛା ପାଇପାରିଥାଏ ।

ବାସାୟନିକ ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା:

- > ଯବକ୍ଷାରକାର: ଫସ୍ତରସ୍ : ପତାଘ : ୬୦:୪୦:୪୦ କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ।

- > ପୁଲିଆର ରୂପେ ଯବକ୍ଷାରକାର ସାରର ଅଧା, ପୁର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାର ଫସ୍ତ ଫରସ୍, ବୃକ୍ଷ ବୃତାଫାଣ ପତାଘ ସାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ । ଅବଶିଷ୍ଟ ଯବକ୍ଷାରକାର ସାରକୁ ୨ ଭାଗ କରି ୧ ଭାଗ ରୋଡ଼ରେ ୩ ସପ୍ତାହପରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଗଟି ଯୋଡ଼େରା ରୂପେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ । ବାକି ଥିବା ଏକ ବୃତାଫାଣ ପତାଘ ସାର ଯୋଡ଼େ ସାର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ।

- > ଯବକ୍ଷାରକାର ସାରକୁ ପିଲ ଏବଂ ଯୋଡ଼େ ସାର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ କଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ଏବଂ ସାର ପ୍ରୟୋଗର ୨-୬-୩୬ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି କଳଦେସନ କରିବା ଉଚିତ ।

- > କିଙ୍ଗ୍ ଅଭାର ପରିଲିଖିତ କମ୍ପିରେ ହେକ୍ଟର ପଛା ୨୫ କି.ଗ୍ରା. କିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ।

ଅମାବନା ଘାସ ପରିଚାଳନା:

- > ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପଛା ହେପ୍ଟୋକ୍ଲୋରିନ୍ ୧.୬ ଲିଟର କିମ୍ବା ଆନିଲୋଫସ୍ ୦.୫ କି.ଗ୍ରା. କୁ ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶେଇ ଚଳି ରୋଇବାର ୪-୬ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ପାଣିଥିବା କମ୍ପିରେ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ ।

- > ଉପଯୋଗ୍ୟ ବାସାୟନିକ ଫରାସ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ୫୦ କି.ଗ୍ରା. ବାଲିରେ କିମ୍ବା ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ସୁରିଆ ସାରରେ ମିଶାଇ ସମାନ ଭାବରେ କମ୍ପିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ । କମ୍ପିରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ଅନୁଚିତ ।

- > କୌଣସି ବାସାୟନିକ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନଥିଲେ ଏହା ବଦଳରେ ୨ ଥର ହାତବନ୍ଧା ଧାନ ରୋଇବାର ୨୦ ଦିନ ୧୪୦ ଦିନ ପରେ କରାଯାଏ ।

- > ଧାଡିରେ କରାଯାଇଥିବା ଫସଲରେ କୋମେ ଘାସ ବନ୍ଧା ଯତ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ ।

କଳ ପରିଚାଳନା:

- > ଚଳି ରୋଡ଼େର ଏକ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପି ଆର୍ଡୁରା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ରୁଡ଼ିଂ ରହେ ।
- > ଫସଲ ବୃଦ୍ଧି ସମୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାର ବୋଳିବା ଅବସ୍ଥାର ୧୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩-୫ ସେ.ମି. ର ଏକ କଳଝର କମ୍ପିରେ ରଖାଯାଏ । କିଛି ଶାର୍ଷ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ୨୪-୩୬ ଘଣ୍ଟା ପରେ କଳଦେସନ କରାଯାଇଥାଏ ।